MONOARTRITIS PERSISTENTE DE RODILLA, EN PACIENTES CON POLIARTRITIS CRÓNICA BIEN CONTROLADA

¿ES EL ORTHOKINE UNA OPCIÓN TERAPÉUTICA?

Dr. José De La Mata

INTRODUCCION

- Las poliartritis crónicas son trastornos que cursan con inflamación sostenida y progresiva de múltiples articulaciones.
- Pueden ser altamente invalidantes y deformantes
- Comparten una etiopatogenia autoinmune
- Requieren un tratamiento indefinido con inmunomoduladores.
- El tratamiento siempre es SISTÉMICO.

MONOARTRITIS CRÓNICA PERSISTENTE

- Ocasionalmente, hay articulaciones que “escapan” al control terapéutico
- No suelen responder al aumento de la medicación sistémica
- Es un problema terapéutico difícil.
- El tratamiento siempre suele ser LOCAL:
 - A. Infiltraciones corticoides
 - B. Sinoviortesis radioactiva
 - C. Sinovectomía quirúrgica

HIPOTESIS

Plasma Autólogo Condicionado

OBJETIVO

EVALUAR LA UTILIDAD DEL ORTHOKINE EN EL TRATAMIENTO DE LA MONOARTRITIS
PERSISTENTE DE RODILLA

METODOS

- **Diseño**: Serie de casos. Estudio abierto observacional.
- **N= 7**
- **Criterios de inclusión**: A + B + C
 - A. Poliartritis crónica bien controlada : Artritis Reumatoide (**AR**) o Poliartritis Crónica Sero-Negativa (**PCSN**)
 - B. Monoartritis crónica de una o ambas rodillas > 3m evolución
 - C. Refractaria a corticoides IA
- **Criterios de exclusión**: sospecha de etiología infecciosa, microcristalina (gota o condrocalcinosis), gonartrosis.
- **Intervención**: Orthokine IA semanal (x4 ó x6) ± artrocentesis semanal
- **Outcomes**:
 - Primario: desaparición del derrame e inflamación
 - Secundario: mejoría del dolor
- **Seguimiento**: ≥ 1 año

RESULTADOS

PACIENTE	EDAD (SEXO)	TIPO DE ARTRITIS (Tiempo de diagnóstico)	TIEMPO DE EVOLUCIÓN MONOARTRITIS PERSISTENTE	ARTICULACIÓN	TRATAMIENTO	ORTHOKINE	RESPUESTA		
							1 m	3 m	12 m
RFG	66 (M)	PCSN (15 a)	9 años	Ambas RR	LEF+ Pred 5 mg * Sinoviortesis (2003, 2011)	x4	SÍ	NO Derrame RI	NO
DCA	75 (M)	PCSN (4 a) *ANAs(+)	6 m	Ambas RR	RES + Pred 7.5 mg/d	x4	NO	SÍ	NO
TGH	73 (M)	PCSN (5 a)	7m	RD	MTX	x6	SÍ	SÍ	-
MSP	49 (M)	PCSN (45 a)	45 años	RI	MTX + Pred 5 mg/d	x4 A los 14 m x6	SÍ	SÍ	SÍ
PSG	74 (M)	AR FR (+) Anti-PCC (+) (2 a)	14 m	RD	MTX + Pred 10 mg/d	x6	SÍ	SÍ	SÍ
BFS	68 (M)	AR FR (+) Anti PCC (+) (50 a)	7m	RD	MTX + LEF + MP 8 mg/d	x4	NO	SÍ	SÍ
IGP	60 (V)	AR FR (+) Anti PCC (+) (7 a)	8m	RI	MTX + DOL+ Pred 2.5 mg/d	x4 A los 25 m x6	SÍ	SÍ	SÍ

PCSN: Poliartritis Crónica Sero-Negativa; **AR:** Artritis Reumatoide; **FR:** Factor Reumatoide; **Anti-PCC:** Ac Anti-Péptido Cíclico Citrulinado; **ANAs:** Ac Anti-nucleares
MTX: Metotrexato; **LEF:** Leflunamida; **Dol:** Dolquine; **Pred:** Prednisona; **MP:** Metil-Prednisolona

RESUMEN

- Todos los pacientes obtuvieron algún tipo de beneficio en los 3 primeros meses
- Más de la mitad obtuvieron una respuesta sostenida (al menos) 1 año
- En pacientes con AR de mal pronóstico la tasa de respuesta fue del 100%. No se puede definir un perfil de "paciente respondedor"
- El Orthokine no parece una buena alternativa para pacientes con artritis persistente en > 1 articulación.
- Un ciclo con 4 infiltraciones puede ser suficiente
- Un segundo ciclo "de rescate" parece resultar útil.
- No se registraron efectos adversos

CONCLUSIONES

- I. El Orthokine IA (x4) puede ser una alternativa útil y segura para pacientes con poliartritis crónica bien controlada que tienen monoartritis persistente de rodilla.
- II. La respuesta clínica es tardía (1 a 3 m) y la tasa de respuesta > 1 año supera el 50%
- III. Podría ser una buena alternativa para pacientes con AR de mal pronóstico
- IV. No parece adecuado para pacientes con artritis en ambas rodillas.